



HOPITAL
SAINT JOSEPH
MARSEILLE

**CONSEILS AUX PATIENTS
TRAITES PAR ORENCIA**

SERVICE DE RHUMATOLOGIE

Unité rhumatismes inflammatoires

Dr Denis ARNIAUD

Chef de service

ORENCIA



ABATACEPT

INDICATIONS



- **POLYARTHRITE RHUMATOÏDE modérée à SEVERE**

CHEZ L'ADULTE

**Résistante aux traitements de fond habituels,
et à au moins un anti TNF-ALFA**

COMPOSITION



L'ABATACEPT est une protéine de fusion entièrement humanisée.

L'ABATACEPT agit sur les lymphocytes T qui participent au processus inflammatoire.

L'ABATACEPT est une Bio Thérapie.

Ce traitement est en association avec le Méthotrexate.

ADMINISTRATION



Perfusion à J0, puis J15 soit 15 jours après la 1ère perfusion.
puis J30 soit 15 jours après la 2ème perfusion, puis toutes les
4 semaines.

Une grande rigueur doit être observée dans ces dates.



La perfusion dure 30 minutes environ.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.

Un bilan sanguin avant chaque injection sera prévu.

Une ordonnance vous sera délivrée.

Au moins 48 h avant votre rendez-vous de perfusion, nous
vous prions de nous faxer vos résultats au Service de
Rhumatologie **Fax : 04.91.80.64.85**

Il est réalisé pour vérifier :

- l'efficacité du traitement
- la toxicité hépatique
- l'absence de signes infectieux.

ACTION



L'ORENCIA agit sur le processus de l'inflammation et entraîne la modulation des défenses immunitaires.

L'intérêt de ce médicament est de ralentir les dommages causés par la maladie, et de réduire les douleurs de façon significative.

RÉPONSE CLINIQUE



Les effets du traitement peuvent apparaitre à partir du deuxième mois.

Mais les réponses peuvent varier d'un individu à un autre.

L'expérience nous montre qu'il faut patienter jusqu'à 3 mois pour évaluer la pleine efficacité du traitement.

LE RISQUE ALLERGIQUE

Il est rare mais peut exister et explique la surveillance en milieu hospitalier.



Les réactions allergiques peuvent se manifester par

- des démangeaisons,
- un urticaire,
- un œdème de Quincke,
- des douleurs lombaires aiguës
- voire des signes de choc.

Ces réactions sont rarissimes.

Différents effets secondaires peuvent se rencontrer:

- maux de tête
- nausées, vomissements
- vertiges
- augmentation de la pression artérielle
- asthénie
- flush

Ces effets sont rares mais peuvent survenir pendant la perfusion.

LE RISQUE INFECTIEUX



L'Abatacept peut entraîner une baisse des défenses immunitaires par son action sur les lymphocytes.

Par conséquent, un patient sous ORENCIA peut être plus sensible aux infections.

Une infection banale peut rapidement se compliquer.

Il est donc nécessaire que le patient sache se surveiller.

SIGNES A SURVEILLER D'INFECTION DÉBUTANTE



- fièvre,
- toux,
- rhume,
- sinusite,



- bronchite,
- brûlures mictionnelles,
- diarrhée,

- une plaie (prévoir antiseptique + pansement sec)
- un ongle incarné (pédicure + pansement si nécessaire)
- ou tout autre signe inhabituel (perte de poids, asthénie importante, fatigue).

Le patient ne bénéficiera pas de sa perfusion s'il présente un de ces signes, sauf après examen médical complet et/ou examens complémentaires.

INTERVENTION CHIRURGICALE



Si une intervention chirurgicale est programmée
(ex : mise en place d'une prothèse)

Contactez votre chirurgien et votre rhumatologue,
afin de juger du moment le plus opportun pour l'arrêt et la
reprise du traitement

Bien sûr, une intervention chirurgicale en cas d'urgence
pourra toujours se faire même en absence d'arrêt de
l'ORENCIA®.

ORENCIA ET GROSSESSE



S'il existe un désir de grossesse ou de paternité,

Il est nécessaire **chez l'homme comme chez la femme d'en parler avec votre rhumatologue avant d'envisager la conception.**

Cependant, actuellement, le délai préconisé est d'envisager la conception quatorze semaines après la dernière perfusion.

MÉTHODE DE CONTRACEPTION

Efficace durant ce délai.

VACCINATIONS



Le patient peut recevoir un vaccin vivant durant le traitement :

- fièvre jaune,
- ROR,
- BCG,
- Poliomyélite

Au moins un mois avant l'instauration du traitement, ces vaccinations seront éventuellement à faire (parlez-en à votre médecin).

Il n'y a aucun risque pour les vaccins inactivés et ils sont **même recommandés** un mois avant la 1^{ère} perfusion.:

- Grippe
- Tétanos
- Pneumocoque

VOYAGES



Pour un voyage, prévoir une trousse à pansements avec :

- produits antiseptiques
- traitement pour troubles du transit (ce traitement sera prescrit par votre médecin).

Éviter l'eau non cachetée dans certains pays.

AUTRES

- **Penser à vous laver les mains régulièrement (mesures d'hygiène de base).**

☀ Soleil



Prendre les précautions habituelles de protections.

De plus, une consultation régulière avec un dermatologue est recommandée afin de surveiller toute apparition de **carcinome de la peau (1 fois par an)**

- **Alcool:** avec modération.
- **Tabac:** à éviter (diminue l'immunité).



- **Climatisation:** à éviter (risque d'infection ORL).
- **Autres traitements:** pas d'incompatibilité, sauf avec le KINERET, l'ENBREL, l'HUMIRA et le REMICADE
- L'ORENCIA ne provoque pas de chute des cheveux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE



Si problèmes ou conseils:



**HOPITAL
saint JOSEPH
MARSEILLE**

☎ Service de Rhumatologie

Service : 04.91.80.66.33

Secrétariat : 04.91.80.66.31

Fax : 04.91.80.64.85

☎ Médecin-traitant: nom
N° téléphone:

☎ Rhumatologue: nom:
N° téléphone:

DOCUMENT ÉLABORE

PAR L'ÉQUIPE DU SERVICE DE RHUMATOLOGIE

Dr Denis ARNIAUD
Dr Min Duc NGUYEN
Dr Alain MATTERA

Dr Jean-Pierre ARNAL
Dr Jean-Louis ULMANN
Dr Olivier ROTH



HOPITAL
saint JOSEPH
MARSEILLE