



HOPITAL
SAINT JOSEPH
MARSEILLE

CONSEILS AUX PATIENTS
TRAITES PAR **REMICADE**

SERVICE DE RHUMATOLOGIE

Unité rhumatismes inflammatoires

Dr Denis ARNIAUD

Chef de service

REMICADE®



INFLIXIMAB

ANTI-TNF ALPHA

INDICATIONS



- **POLYARTHRITE RHUMATOÏDE**
- **SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE**
- **RHUMATISME PSORIASIQUE**
- **MALADIE DE CROHN**
- **UVÉITE**

■ COMPOSITION



L'INFLIXIMAB est un anticorps monoclonal homme/souris (30 % de protéines murines).

C'est un anti TNF-ALPHA.

L'INFLIXIMAB se lie à une protéine présente dans l'organisme, appelée le facteur de nécrose tumorale alpha (ou TNF ALPHA), qui participe au processus inflammatoire.

Le REMICADE® est une **Biothérapie**.

REMICADE®



INFLIXIMAB

ANTI-TNF ALPHA

INDICATIONS



- **POLYARTHRITE RHUMATOÏDE**
- **SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE**
- **RHUMATISME PSORIASIQUE**
- **MALADIE DE CROHN**
- **UVÉITE**

■ COMPOSITION



L'INFLIXIMAB est un anticorps monoclonal homme/souris (30 % de protéines murines).

C'est un anti TNF-ALPHA.

L'INFLIXIMAB se lie à une protéine présente dans l'organisme, appelée le facteur de nécrose tumorale alpha (ou TNF ALPHA), qui participe au processus inflammatoire.

Le REMICADE® est une **Biothérapie**.

ADMINISTRATION



Perfusion à J1 puis J15 soit 15 jours après la 1^{ère} puis J42 soit 1 mois après la 2^{ème}, puis toutes les huit semaines.

Une grande rigueur doit être observée dans ces dates.



Un bilan sanguin avant chaque injection sera prévu.

Une ordonnance vous sera délivrée.

Au moins 48 h avant votre rendez-vous de perfusion, nous vous prions de nous faxer vos résultats au Service de Rhumatologie **Fax : 04.91.80.64.85**

Il est réalisé pour vérifier :

- l'efficacité du traitement
- la toxicité hépatique
- l'absence de signes infectieux.

ACTION



Le Remicade® agit sur le processus de l'inflammation et entraîne la diminution des défenses immunitaires.

L'intérêt de ce médicament est de ralentir les dommages causés par la maladie, et de réduire les douleurs de façon significative.

RÉPONSE CLINIQUE



Les effets du traitement peuvent apparaître à partir de la première perfusion.

Mais les réponses peuvent varier d'un individu à un autre.

L'expérience nous montre qu'en moyenne les effets apparaissent après la troisième perfusion.

LE RISQUE ALLERGIQUE

Il est majoré par la présence de protéines murines et explique la surveillance en milieu hospitalier avec deux heures obligatoires après la fin de l'injection.

Les réactions allergiques peuvent se manifester par

- des démangeaisons,
- un urticaire,
- un œdème de Quincke,
- des douleurs lombaires aiguës
- voire des signes de choc.

Généralement, ces signes ont lieu pendant ou dans les deux heures qui suivent la perfusion.

Pendant, si vous présentez ce type de symptômes à votre retour à domicile, prévenez immédiatement votre médecin ou l'hôpital.



LE RISQUE INFECTIEUX



Les anti-TNF alpha peuvent entraîner une baisse des défenses immunitaires.

Par conséquent, un patient sous anti-TNF peut être plus sensible aux infections.

Une infection banale peut rapidement se compliquer.

Il est donc nécessaire que le patient sache se surveiller.

SIGNES A SURVEILLER D'INFECTION DÉBUTANTE



- fièvre,
- toux,
- rhume,
- sinusite,



- bronchite,
- brûlures mictionnelles,
- diarrhée,

- une plaie (prévoir antiseptique + pansement sec)
- un ongle incarné (pédicure + pansement si nécessaire)
- ou tout autre signe inhabituel (perte de poids, asthénie importante, fatigue).

Le patient ne bénéficiera pas de sa perfusion s'il présente un de ces signes, sauf après examen médical complet et/ou examens complémentaires.

INTERVENTION CHIRURGICALE



Si une intervention chirurgicale est programmée
(ex : mise en place d'une prothèse)

Le REMICADE® doit être arrêté deux mois et demi avant

(Le temps d'éliminer le produit de l'organisme).

Bien sûr, une intervention chirurgicale en cas d'urgence
pourra toujours se faire même en absence d'arrêt du
REMICADE®.

**La reprise du traitement se fera après autorisation du
Médecin Traitant ou du Rhumatologue.**



**En cas d'extraction dentaire, le traitement devra être
arrêté 1 mois avant avec avis du Médecin.**

Le médecin vous prescrira éventuellement des antibiotiques.

REMICADE ET GROSSESSE



S'il existe un désir de grossesse ou de paternité,

Chez l'homme comme chez la femme, il est nécessaire d'arrêter le traitement trois mois avant y compris pour le Méthotrexate, traitement habituellement associé.

MÉTHODE DE CONTRACEPTION

Efficace durant ces trois mois.

VACCINATIONS



Le patient ne peut recevoir un vaccin vivant durant le traitement.

Pendant le traitement sont à éviter les vaccins suivants :

- fièvre jaune,
- ROR,
- BCG,
- Poliomyélite

Au moins un mois avant l'instauration du traitement, ces vaccinations seront éventuellement à faire (parlez-en à votre médecin).

On ne peut se faire administrer de vaccin vivant qu'après un arrêt du traitement. Pensez à vérifier votre carnet de vaccination avant le début du traitement.

Il n'y a aucun risque pour les vaccins inactivés

et ils sont même recommandés :

- Grippe
- Tétanos
- Pneumocoque

VOYAGES



Pour un voyage, prévoir une trousse à pansements avec :

- produits antiseptiques
- traitement pour troubles du transit (ce traitement sera prescrit par votre médecin).

Éviter l'eau non cachetée dans certains pays.

AUTRES

- Penser à vous laver les mains régulièrement (mesures d'hygiène de base).

☀ Soleil



Prendre les précautions habituelles de protections.

De plus, une consultation régulière avec un dermatologue est recommandée afin de surveiller toute apparition de carcinome de la peau (1 fois par an)

- Alcool: avec modération.
- Tabac: à éviter (diminue l'immunité).



- Climatisation: à éviter (risque d'infection ORL).
- Autres traitements: pas d'incompatibilité, sauf avec le KINERET, l'HUMIRA et l'ENBREL.
- Le REMICADE ne provoque pas de chute des cheveux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE



Si problèmes ou conseils:



**HOPITAL
SAINT JOSEPH
MARSEILLE**

**☎ Service de Rhumatologie
Service : 04.91.80.66.33
Secrétariat : 04.91.80.66.31
Fax : 04.91.80.64.85**

**☎ Médecin-traitant: nom
N° téléphone:**

**☎ Rhumatologue: nom:
N° téléphone:**

DOCUMENT ÉLABORE

PAR L'ÉQUIPE DU SERVICE DE RHUMATOLOGIE

Dr Denis ARNIAUD

Dr Min Duc NGUYEN

Dr Alain MATTERA

Dr Jean-Pierre ARNAL

Dr Jean-Louis ULMANN

Dr Olivier ROTH



HOPITAL
SAINT JOSEPH
MARSEILLE